

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022



Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
1,4SIGHT	5609								x			
Admiral 10 EC	5336								x			
Agroxone/Nufarm MCPA 750	3236					x						
ALAR 85 SG	4329								x			
Allstar	5691									3:e år		
Amistar/Mirador/Zaftra AZT 250SC/Quadris	5465		50%, 90% ^{1, 2, 6, 7}							2:a/3:e år ⁶		
Amistar Gold	5416									3:e år		
Ariane S	3856						x	x				
Ascra Xpro	5272					x	x					
Avaunt	5433 Användningsförbud från 2022-09-20											x

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältskant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten inte spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent beväxens skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022

Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.



		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Aviator Xpro EC 225	5292						x					
Axial 50 EC	5669									1/2:a år ⁷		
Azatin EC	5505								x			
Balaya	5692					x						
Banjo 500 SC	5187						x					
Banjo Forte	5096					x	x					
Basagran SG	4115					x				3:e år ⁶		
BASF Cycocel Plus	5257							x	x			
Betasana SC	4967										x	
Biathlon 4D	5401							x				
Biox-M	5031							x	x			
Bonzi	5290								x		x ⁶	

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent be vuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022

Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.



		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Border 100 SC	5581	x				x				1/2:a år ⁷		
Border 100 SC	5724	x				x				1/2:a år ⁷		
Boxer/Linati	5565		75% ¹	500 m ⁸	x ⁹		x					
Callisto/Meristo	5582	x								1/2:a år ⁷		
Callisto	5710	x								1/2:a år ⁷		
Camposan Extra	5650								x			
Candit	4211								x	5:e år ⁶		
Caryx	5452					x						
Centium 36 CS	4778									3:e år ⁶	x ⁶	
Cerone	3571					x						
Cleravo	5330	x										
Clomate	5521									3:e år		

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent beväxens skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022



Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Conaxis	5703									3:e år		
Contans WG	4677							x				
Conviso One/ Conviso One OD/Conviso One SW	5254	x ⁷										
Corum	5631									3:e år		
Cymbal 45	5047							x		3:e år		
Danitron 5 SC	4604		99% ^{1, 2, 11}					x				x
DAZIDE ENHANCE	5033								x			
Delan Pro	5520		90% ^{1, 2}									
Delan WG*	5390		90% ^{1, 2}					x				
Difcor 250 EC	5601										x ⁶	

* Produkten får inte appliceras med "Ultra low volume application"

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent beväxning skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.
--	---	--	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022



Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Diflanil 500 SC	4989	x										
DMA 600	5364					x						
Duplosan D	5664					x						
Duplosan Max	3345					x						
Elatus Era	5321					x		x				
Elatus Plus	5315		50% ^{1, 2}			x						
Event Super/Puma	4222										x ⁶	
Fenix	5288		50% ^{1, 2, 6}					x				
Fibro	5174		50% ^{1, 2, 6}									x
Floramite 240 SC	4832	x						x	x			
Flurostar XL	5725					x						
Folicur Xpert	5413		50% ^{1, 2, 6}						x		x ⁶	

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent beväxens skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022

Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.



		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Fusilade Max	5684	x ⁷						x	x	2:a år ⁶		
Geoxe 50 WG	5404								x			
Goltix Gold	5625									3:e år		
Goltix Queen	5560									3:e år		
Goltix WG	5261						x	x				
Gratil 75 WG/ Eagle WG	4232	x ⁶	50% ^{1, 3, 6}									
Hussar Plus OD	5221 Användningsförbud från 2022-07-21					x						
Hussar Plus OD	5661		50% ^{1, 2, 6}									
INFINITO	5072									3:e år	x ⁶	
Jura	5568		75% ¹	500 m ⁸	x ⁹	x						
Kalif 360 CS	5309									3:e år		

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältskant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent beväxning skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022



Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Kerb Flo 400	4610										x ⁶	
Kinvara	5530	x										
K-Obiol EC 25	5014							x				x
KRYPT 540	5551										x ⁶	
Kudos	5659	x										
Kumulud DF	3022	x ⁶	50% ^{1, 3, 6}									
Kunshi	5306						x	x				
Lancelot	5252										x	
Leander	5459		75% ^{1, 2, 7}			x						
Lentagran WP	5214								x			
Leopard	5624	x										
Mainspring	5558											x
MaisTer	4906		x ¹²									
MaisTer Power	5694	x				x						

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent beväxning skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022

Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.



		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Mavrik/Evure Neo	4491		90% ⁶								x	
Medax Max	5317										x	
Metaxon	5700					x						
Milbeknock	4928											x
Mirador 250 SC	5464		50%, 90% ^{1, 2, 6, 7}							2:a/3:e år ⁶		
Mistral 70 WG	5226		10 m ¹³									
Moddus Start/Moddevo	5194										x	
Mospilan/Mospilan SG	4739	x							x			
Mospilan SG	5708	x	50% ⁶ , 75% ^{1, 2, 11}						x	2:a/3:e år ⁶		

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältskant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten inte spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent beväxens skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022



Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förorhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Movento SC 100	5246								x			
Mustang Forte	5266										x	
Nautius	5113	x										
NeemAzal-T/S	5387								x			
Nexide CS	5595		50% ^{1, 2}									x
Nissorun SC	5334								x			
OgräsNIX PROFFS	5630						x					
Onyx	5487		50% ^{2, 7}									
Orocid Plus	5605								x			
Ortiva Top	5423								x			
Othello OD	5653		50% ^{1, 2, 7}									
Pantera 40 EC	5677					x			x	2:a år ⁶		

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten inte spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent beväxens skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022



Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Pico 750 WG	5510		50% vår, 75% höst ^{1, 2}									
Pirimor	5463							x	x			
Pirouette	5298								x		x ⁶	
Pomax	5640								x			
Previcur Energy	5046								x			
Proman	5348									3:e år		
Purelo	5567		75% ¹	500 m ⁸	x ⁹	x						
Raptol	5351		50%, 75%, 90%, 99% ^{1, 2, 6}									x
Requiem prime	5504				x ¹⁰				x			
Revytrex	5585					x						
Roundup PowerMax	5296							x				

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten inte spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent beväxning skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022



Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Roxy 800 EC/ Pro-Opti	5566	x	75% ¹	500 m ⁸	x ⁹		x					
Sekator Plus OD	5564	x	50% ^{1, 5}			x					x	
Select	5468	x ⁶										
Select Plus	5293								x		x	
Shirlan/DALI-MO/Frownicide/ Ohayo/Winby	3957						x					
Signum	4884		25% ^{1, 2, 11}						x			
Siltra Xpro EC 260	5284						x					
Silvron Xpro	5706								x			
Spotlight Plus	5577									2:a år ⁶		
Starship	5716	x								1/2:a år ⁷		

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent be vuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden



Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Steward 30 WG	5429 Användningsförbud från 2022-09-20											x
Sumi-alpha 5 FW	5273								x			
Syllit 544 SC	5216					x						
Talius	5498					x			x			
Tanaris	5411									3:e år		
Teldor WG 50	4339	x ¹¹										
TEPPEKI/HINODE	4966							x	x			x
Tern 750 EC	4371		90% ^{1, 7}									
Terpal (II)	4579					x						
Timeline FX	5683	x										

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent beväxens skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2022



Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.						
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningsskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verksamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörderester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Tocalis	5711	x								1/2:a år ⁷		
Tomahawk 200 EC	5236					x						
Tombo	5267										x	
Topas 100 EC	5367								x			
Trimmer 500 WG	5171	x										
Tripali	5436	x										
Variano Xpro	5533						x		x			
Vertimec	4693								x			x
Zignal	5061					x						
Zypar	5274										x	

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov dosspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.

4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.

5. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor befinner sig långvarigt och/eller från växter utanför fältet.

6. Kravet varierar beroende på gröda.

7. Kravet varierar beroende på dos.

8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.

11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.

12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.

13. Permanent be vuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.