

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk-samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
1,4SIGHT	5609								x				
ABRAN 250	5827								x				
Admiral 10 EC	5336								x				
Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets	5755								x				
Agroxone/ Nufarm MCPA 750	3236					x							
ALAR 85 SG	4329								x				
Allstar	5691									3:e år			
Amistar/ Mirador/Zaftra AZT 250SC/ Quadris	5465		50%, 90% ^{1,2,6,7}							2:a/3:e år ⁶			
Amistar Gold	5416									3:e år			

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|
| 1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används. | 2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken. | 3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant. | 4. Vid spridning närmare än 100 meter från området där människor uppehåller sig varaktigt. | 5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet. | 6. Kravet varierar beroende på gröda. | 7. Kravet varierar beroende på dos. | 8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion. | 9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning. | 10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta. | 11. Kravet gäller spridning med fläktspruta. | 12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling. | 13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året. | 14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm. | 15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker. |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdrifts-reducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparat-påfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings-skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk-samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Argos	5766								x				
Ariane S	3856						x	x					
Ascernity	5681		90% ²										
Ascra Xpro	5272					x	x						
Aviator Xpro EC 225	5292						x						
Axial 50 EC	5669									1/2:a år ⁷			
Azatin EC	5505								x				
Balaya	5692					x							
Banjo 500 SC	5187						x						
Banjo Forte	5096					x	x						
Barracuda	5863	x				x			x				
Basagran SG	4115					x				3:e år ⁶			
BASF Cycocel Plus	5257							x	x				

- Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.
- Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.
- Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.
- Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.
- Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.
- Kravet varierar beroende på gröda.
- Kravet varierar beroende på dos.
- Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
- Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
- Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.
- Kravet gäller spridning med fläktspruta.
- Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.
- Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.
- Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.
- Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdrifts-reducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparat-påfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings-skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk-samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Betasana SC	4967										x		
Biathlon 4D	5401							x					
Biox-M	5031							x	x				
BOLT 250	5825								x				
Bonzi	5290								x				
Border 100 SC	5724	x				x				1/2:a år ⁷			
BotaniGard WP	5406							x					
Botiga	5815					x			x				
Boxer/Linati	5565		75% ¹	500 m ⁸	x ⁹		x						
Boxer	5760		75%, 90% ^{1,6}	500 m ⁸	x ⁹		x						
Callisto	5710	x								1/2:a år ⁷			
Callisto 100 SC	5854	x								1/2:a år ⁷			
Camposan Extra	5650								x				

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdrifts-reducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparat-påfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings-skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk-samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Candit	4211								x	5:e år ⁶			
Caryx	5452					x							
CDQ SX	5779	x											
Cedress	4935							x					
Centium 36 CS	4778									3:e år ⁶	x ⁶		
Cerall	4746							x					
Cerone	3571					x							
Clentiga	5772	x							x	3:e år ⁶			
Cleravo	5330, 5834	x							x	3:e år ⁶			
Clomate	5521									3:e år			
Conaxis	5703									3:e år			
Contans WG	4677							x					

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk- samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde- rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Conviso One/ Conviso One OD/Conviso One SW	5254	x ⁷											
CORRIB 250	5828								x				
Corum	5631									3:e år			
Cymbal 45	5047, 5816							x		3:e år			
Danitron 5 SC	4604		99% ^{1,2,11}					x					x
DAZIDE ENHANCE	5033								x				
Delan Pro	5520		90% ^{1,2}										
Delan WG	5390		90% ^{1,2}					x					
Difcor 250 EC	5601										x ⁶		
Diflanil 500 SC	4989	x											
Dipel DF	5243							x					

- Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.
- Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.
- Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.
- Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.
- Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.
- Kravet varierar beroende på gröda.
- Kravet varierar beroende på dos.
- Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
- Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
- Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.
- Kravet gäller spridning med fläktspruta.
- Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.
- Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.
- Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.
- Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk-samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
DMA 600	5364					x							
Duplosan D	5664					x							
Duplosan Max	3345					x							
Elatus Era	5321					x			x				
Elatus Plus	5315		50% ^{1,2}			x							
Euskatel	5765								x				
Evagio Plus	5842									3:e år			
Event Super/ Puma	4222										x ⁶		
Evolya	5723	x								1/2:a år ⁷			
Express 50 SX	5777	x											
Fenix	5288		50% ^{1,2,6}						x				
Fibro	5174, 5817		50% ^{1,2,6}										x

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk- samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde- rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs	4867		x										
Floramite 240 SC	5774							x	x				
Flurostar XL	5725					x							
Folicur Xpert	5413		50% ^{1,2,6}						x		x ⁶		
Force 20 CS	5365							x					
Fusilade Max	5684	x ⁷						x	x	2:a år ⁶			
Geoxe 50 WG	5404								x				
Glyphomax 480	5750	x	x ¹⁴ , 50% ^{1,5,6,7}										
Goliath	5260								x				
Goltix Gold	5625									3:e år			
Goltix Queen	5560									3:e år			
Goltix SC 700	5259								x				

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verkamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Goltix WG	5261						x	x					
Gratil 75 WG/ Eagle WG	4232	x ⁶	50% ^{1,3,6}										
Harmonix Turf Defense	5857							x					
HINODE	5866												x
Hussar Plus OD	5661		50% ^{1,2,6}										
INFINITO	5072									3:e år			
Innox	5856					x			x				
Jablo FL	5871	x	x ¹⁴ , 50% ^{1,5,6,7}										
Jura	5568		75% ¹	500 m ⁸	x ⁹	x							
Jura	5762		90% ¹	500 m ⁸	x ⁹		x						
Kalif 360 CS	5309									3:e år			
Kerb Flo 400	4610										x ⁶		

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk-samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Kinvara	5530	x											
K-Obiol EC 25	5014, 5801							x					x
KRYPT 540	5551										x ⁶		
Kudos	5659	x											
Kumuluf DF	3022	x 6	50% ^{1,3,6}										
Kunshi	5306						x	x					
LALSTOP CONTANS WG	5756							x					
LALSTOP G46 WG	5738							x					
Lancelot	5252										x	x	
Leander	5459		75% ^{1,2,7}					x					
Lentagran WP	5214, 5818								x				

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk-samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Leopard	5624	x											
Linati	5803		75%, 90% ^{1,6}	500 m ⁸	x ⁹		x						
Mainspring	5558												x
MaisTer	4906		x ¹²										
MaisTer Power	5694	x				x							
Mavrik/Evure Neo	4491	x ⁶	50%, 75%, 99% ^{2,6} 90% ⁶						x		x		
Medax Max	5317										x		
Metaxon	5700					x							
Milbeknock	4928, 5819												x
Mirador 250 SC	5464		50%, 90% ^{1,2,6,7}							2:a/3:e år ⁶			
Mistral 70 WG	5226			10 m ¹³									
Moddus Start/ Moddevo	5194										x		

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från området där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk-samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Mospilan/ Mospilan SG	4739	x							x				
Mospilan SG	5708	x	50% ⁶ , 75% ^{1,2,11}						x	2:a/3:e år ⁶			
Movento SC 100	5246								x				
Mustang Forte	5266										x	x	
Mycostop	4295							x	x				
Nautius	5113	x											
NeemAzal-T/S	5387								x				
Nexide CS	5595		50% ^{1,2}										x
Nissorun SC	5334								x				
OgräsNIX PROFFS	5630							x					
Ohayo	5867						x		x ¹⁵				

- Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.
- Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.
- Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.
- Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.
- Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.
- Kravet varierar beroende på gröda.
- Kravet varierar beroende på dos.
- Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
- Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
- Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.
- Kravet gäller spridning med fläktspruta.
- Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.
- Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.
- Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.
- Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdrifts-reducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparat-påfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings-skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk-samma ämnet har i vissa fall begräsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Onyx	5487, 5820		50% ^{2,7}										
Orocid Plus	5605								x				
Ortiva Top	5423								x				
Othello OD	5653		50% ^{1,2,7}										
Pantera 40 EC	5677					x			x	2:a år ⁶			
Pico 750 WG	5510		50% vår, 75% höst ^{1,2}										
Pictor Active	5405								x ⁶				
Pirimor	5463							x	x				
Pirouette	5298								x		x		
Pomax	5640								x				
Previcur Energy	5046								x				

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andningskydd	Villkor för återinträde i behandlat område/lokal	Produkten eller det verkamma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde-rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Proman	5348, 5821									3:e år			
pro-Opti	5768		75%, 90% ^{1,6}	500 m ⁸	x ⁹		x						
Purelo	5567		75% ¹	500 m ⁸	x ⁹	x							
Purelo	5763		90% ¹	500 m ⁸	x ⁹	x							
Raptol	5351		50%, 75%, 90%, 99% ^{1,2,6}										x
Requiem prime	5504				x ¹⁰				x				
Revyona	5736								x				
Revystar XL	5584								x				
Revytrex	5585					x							
Roundup Flex	5844	x	x ¹⁴ , 50% ^{1,5,6,7}										
Roundup Flick	5845	x	x ¹⁴ , 50% ^{1,5,6,7}										
Roundup PowerMax	5296, 5830							x					

- Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.
- Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.
- Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.
- Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.
- Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.
- Kravet varierar beroende på gröda.
- Kravet varierar beroende på dos.
- Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
- Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
- Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.
- Kravet gäller spridning med fläktspruta.
- Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.
- Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.
- Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.
- Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk- samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde- rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Roundup PowerMax	5869	x	x ¹⁴										
Roundup Ultra	5773	x	50% ^{1,5,6,7}						x				
Roxy 800 EC/ Pro-Opti	5566	x	75% ¹	500 m ⁸	x ⁹		x						
Roxy 800 EC	5761		75%, 90% ^{1,6}	500 m ⁸	x ⁹		x						
Sekator Plus OD	5564	x	50% ^{1,4,5}			x					x		
Select	5468	x ⁶											
Select Plus	5293								x ⁶		x		
Serenade ASO	5251							x	x				
Shirlan/ DALIMO/ Frowncide/ Ohayo/Winby	3957						x		x ¹⁵				
Signum	4884		25% ^{1,2,11}						x				

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från området där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk- samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde- rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Siltra Xpro EC 260	5284						x						
Silvron Xpro	5706								x				
Soratel	5843					x			x				
Spectra FL	5872	x	x ¹⁴ , 50% ^{1,5,6,7}										
Spotlight Plus	5577									2:a år			
Stabilan 400 SL	5770								x		x		
Starship	5716	x								1/2:a år ⁷			
Sumi-alpha 5 FW	5273								x				
Syllit 544 SC	5216					x			x				
Talius	5498					x			x				
Talius	5813					x							
Tanaris	5411									3:e år	x		
TEKO 250	5826								x				

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från området där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk- samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde- rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Teldor WG 50	4339		x ^{6,11}						x				
TEPPEKI/ HINODE	4966							x	x				x
TEPPEKI	5847												x
Tern 750 EC	4371		90% ^{1,7}										
Terpal (II)	4579					x							
Tesanto	5864		50% ^{1,2}			x							
Timeline FX	5683	x											
Tocalis	5711	x								1/2:a år ⁷			
Tomahawk 200 EC	5236					x						x	
Tombo	5267										x	x	
Topas 100 EC	5367								x				
Trimmer 50 SG	5776	x											

- Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning används.
- Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.
- Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.
- Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.
- Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.
- Kravet varierar beroende på gröda.
- Kravet varierar beroende på dos.
- Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
- Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
- Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.
- Kravet gäller spridning med fläktspruta.
- Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.
- Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.
- Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.
- Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden



Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se.
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

		Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda". Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.				Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.							
Preparat	Reg. nr	Anpassat skyddsavstånd bestäms alltid genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"	Särskilt avdriftsreducerande utrustning krävs i vissa fall	Fasta skyddsavstånd krävs i vissa fall	Spridning får i vissa fall enbart göras vid särskild tidpunkt på dygnet och/eller väderleksförhållanden	Påfyllning av sprutan ska ske med särskild hjälp, t.ex. preparatpåfyllare	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med partikel- och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Andnings- skydd	Villkor för återinträde i behandlat område/ lokal	Produkten eller det verk- samma ämnet har i vissa fall begränsningar avseende användning på samma fält kommande år	Skörde- rester får i vissa fall inte användas till foder eller användas utanför företaget	Gödsel som innehåller behandlad halm får enbart användas inom det egna företaget eller gå till förbränning eller industriellt bruk	Särskilda åtgärder krävs till skydd för pollinerande insekter
Trimmer 500 WG	5171	x											
Tripali	5436	x											
Turex 50 WP	4492							x					
Variano Xpro	5533						x		x				
Vertimec	4693								x				x
Zignal	5061					x							
Zypar	5274										x		

1. Vid bestämning av anpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	2. Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.	3. Vid spridning närmare än 100 meter från fältkant.	4. Vid spridning närmare än 100 meter från områden där människor uppehåller sig varaktigt.	5. Vid spridning närmare än 100 meter från växter utanför fältet.	6. Kravet varierar beroende på gröda.	7. Kravet varierar beroende på dos.	8. Vid användning på hösten får produkten inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.	9. Vid användning på hösten får produkten enbart spridas mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.	10. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning med bomspruta.	11. Kravet gäller spridning med fläktspruta.	12. Avskärningsutrustning krävs vid viss tidpunkt i fruktodling.	13. Permanent bevuxen skyddszon mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	14. Vid spridning med handhållna spruta krävs spray-skärm.	15. Personer som kommer i kontakt med behandlad gröda ska i vissa fall informeras om medlets hälsorisker.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---